

| | | 大人の健診 | | | | (女性) | |
|----------|---|-----------|-------|-------|-------------------------|----------------|-------|
| | 検査項目 | HJMスタンダード | クイック | ミニマム | 子どもの健診 | 女性健診 | 乳がん検診 |
| 身体測定 | 身長・体重・BMI(肥満度)・体脂肪率・腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 身長・体重・BMI | |
| 一般診療 | 問診・聴診・触診・血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○乳房触診 |
| 視力 | 視力検査 | ○ | | | ○ ○色覚検査 | | |
| 心電図 | 安静時心電図 | ○ | | ○ | ○ | | |
| 全血算 | 白血球、赤血球、ヘモグロビン | ○ | ○ | ○ | | ○ 鉄(血清鉄) | |
| | 白血球分画・末梢血塗沫・血小板・ヘマクリット・MCV・MCH・MC HC | ○ | ○ | | | ○ | |
| 肝臓 | AST(GOT)・ALT(GPT)・r-GTP | ○ | ○ | ○ | | | |
| | 総蛋白・アルブミン・グロブリン・総ビリルビン・ALP | ○ | ○ | | | | |
| 脂質 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | | ○ | |
| 腎機能電解質 | 尿素・クレアチニン・ナトリウム・カリウム・クロール・カルシウム | ○ | ○ | | | | |
| 尿酸 | 尿酸 | ○ | ○ | | | | |
| 糖代謝 | 血糖 | ○ | ○ | ○ | | | |
| | ヘモグロビン A1c | ○ | ○ | | | | |
| 甲状腺機能 | TSH | ○ | | | | | |
| ウイルス性肝炎 | A型肝炎IgG抗体・B型肝炎HBs抗原・B型肝炎HBs抗体 | ○ | | | | | |
| 尿 | 尿一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 尿沈渣 | ○ | ○ | | | ○ | |
| 便 | 便潜血・虫卵・アメーバー | ○ | | | | | |
| 胸部X線 | 胸部X線 | ○ | | ○ | | | |
| 眼圧・眼底 | 健診医による眼底スクリーニング・空気圧による眼圧検査 | ○ | | | | | |
| 聴力 | 1000Hz(低音)・4000Hz(高音) | ○ | | ○ | | | |
| 腫瘍マーカー | CEA(消化器癌) | ○ | | | | | |
| 炎症反応 | 赤血球沈降速度 | ○ | ○ | | | | |
| 筋肉関連酵素 | CPK | ○ | ○ | | | | |
| 腹部エコー | 腹部超音波検査 | ○ | | | | | |
| 乳腺エコー | 乳腺超音波検査 | | | | ○ (マンモグラフィーへ 変更可) | ○ | |
| マンモグラフィー | 乳腺レントゲン検査 | | | | | ○ | |
| 子宮頸がん | 子宮頸がん検査 | | | | | ○ | |
| レポート | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| 後日結果相談 | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| 料金 | シンガポールドル・別途GST7%がかかります。 | \$520 | \$200 | \$230 | \$80 | \$340 | \$405 |

*マンモグラフィーへ
変更の場合 \$380

| 追加検査 | * シンガポールドル 別途7%消費税がかかります。 | 料金 |
|---------------------|--|---------|
| (女性) | | |
| 乳腺エコー | 超音波による乳腺検査 | \$125 |
| マンモグラフィー | 乳腺レントゲン検査 | \$195 |
| 子宮頸がん検査 | 内診台は使用せず、診察室ベッドで医師が実施します。不正出血や帯下などの婦人科症状がある方は、婦人科受診をおすすめします。(月経中を避けてご来院ください。子宮体がん検査は実施しておりません。) | \$30 |
| 女性ホルモン検査 | 卵巢の機能をホルモン数値で判定します。閉経が近い、月経周期が不定になってきた方へ。 月経開始1日目以降～1週間以内に血液検査を行います。 | \$84 |
| (男性) | | |
| 前立腺腫瘍マーカー | 50歳以上の男性におすすめします。(前立腺がんの肉親の方がおられる場合は40歳以上おおすすめします。) | \$42 |
| (男女共通) | | |
| 大腸がん検査 | 大腸がんを調べる検査です。3年に1度は全大腸内視鏡検査をおすすめします。40歳以上で内視鏡検査を受けない方は、毎年便潜血検査を受けましょう。 | |
| 胃内視鏡検査 | 食道、胃、十二指腸の内視鏡検査です。 | \$1,350 |
| 全大腸内視鏡 | | \$2,400 |
| 胃・大腸内視鏡 | | \$3,150 |
| 便潜血検査 | 便潜血検査(大腸がんスクリーニング検査) | \$35 |
| 腹部超音波 | 腹部臓器を超音波画像で観察します。 | \$248 |
| 眼底撮影検査 | 眼底の写真撮影・眼科医による判定 | \$50 |
| 心機能検査 | 心電図で異常所見があった方、高血圧治療中の方などにおすすめします。 トレドロジル負荷心電図検査 | \$300 |
| ペリコバクターピロリ検査 | 胃がんや胃・十二指腸潰瘍に関連のあるHピロリ菌感染を調べる検査です。血液中のHピロリ菌抗体検査。 | \$58.8 |
| 尿素呼気検査 | 胃に感染し、胃炎や胃潰瘍の原因となるH・ピロリ菌感染を調べる検査です。検査薬を服用し、服用前と30分後の呼気を集めて診断します。胃酸抑制剤や抗生素を内服中は実施できません。 | \$252 |
| 肝炎ウイルス | A型 B型肝炎は、予防接種で防ぐことができます。健診時に免疫の状態を調べてみましょう。(お子様にもお勤めします。) | |
| A・B | A型肝炎・B型肝炎の感染歴や、予防接種の効果を評価します。 | \$58 |
| A・B・C | A型肝炎・B型肝炎・C型肝炎の感染歴を調べます。40歳以上の方で、C型肝炎の検査を受けたことがない方におおすすめします。 | \$98 |
| C | C型肝炎の感染歴を調べます。 | \$54 |
| 骨密度 | DXA(2重エネルギーX線吸収測定法)による骨密度検査 | \$140 |
| 胃バリウム検査 | 造影剤のバリウムを飲んだ後、バリウムで造影される上部消化管(食道から胃、十二指腸まで)をX線で撮影し、胃の形や粘膜に異常がないかを確認する画像検査です。食道がんや胃がん、胃ホリープ、胃潰瘍、胃食道逆流の有無が診断します。 | \$215 |
| GASTROClear 胃がん検 | 血液検査でできる精度の高い胃がんのスクリーニング検査です。 胃がんのマーカーであるmiRNAを測定します。 血液検査の後の処置が必要なため、Mt Elizabeth病院で血液検査を行います。 | \$260 |

